©Ges. zur Förderung d. Erforschung von Insektenwanderungen e.V. München, download unter www.zobodat.at
Atalanta (Juni 2002) **33** (1/2): 5, Würzburg, ISSN 0171-0079

Danaus plexippus, D. chrysippus, Libythea celtis und *Nymphalis xanthomelas* 1992

von

JÜRGEN HENSLE

Allgemeines

Mittlerweile habe ich auch die Meldekärtchen der restlichen Tagfalter aus den zurückliegenden zehn Jahren erhalten. Somit wäre dann ab dem nächsten Heft in der Bearbeitung der Tagfalter wieder Gleichstand erzielt. Auch bezüglich der noch ausstehenden Nachtfalter klingen die neuesten Meldungen erfreulich, so daß guter Grund zu der Hoffnung besteht, daß die gesamten Jahresberichte der DFZS alsbald wieder aktuell erscheinen können.

Danaus plexippus (LINNAEUS, 1758) – Gruppe II, Saisonwanderer 2. Ordnung

Für 1992 liegen keine Meldungen vor.

Danaus chrysippus (LINNAEUS, 1758) – Gruppe III, Binnenwanderer

SCHURIAN et al. berichten in den NeVA **13** (3a): 343–350, daß an den gleichen Stellen um Side in der Südtürkei, an denen sie diese Art im Herbst 1991 häufig auffinden konnten, 1992 nur ein einziger Falter am 17.X. beobachtet haben. Sie führen das fast vollständige Verschwinden auf den dort ungewöhnlich kalten Winter 1991/1992 zurück.

Libythea celtis (LAICHARTING, 1782) – Gruppe II, Saisonwanderer 2. Ordnung

Türkei, Prov. Aydin, 20 km NE Didyma, 2 Ex. am 6.IV. (669).

Nymphalis xanthomelas ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) – Gruppe IV, wanderverdächtige Art

Türkei, 30 km SE Erzincan, 5 Ex. am 22.VII. (669).

Anschrift des Verfassers

JÜRGEN HENSLE
Breitenweg 18
79356 Eichstetten